

Rappels de Première

cours → p.224


7 exercices corrigés → p.225

tsm-cdc-rap-fb1

tsm-cdc-rap-fb2


tsm-cdc-rap-sf1

tsm-cdc-rap-sf2



Le nombre dérivé $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente (T) à la courbe \mathcal{C}_f au point d'abscisse a .

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

**I. Dérivation d'une fonction composée****PROPRIÉTÉ**

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I , à valeurs dans un intervalle J .

Soit g une fonction dérivable sur J .

Alors $g \circ u$ est dérivable sur I et $(g \circ u)' = u' \times (g' \circ u)$.

Démonstration : dans le chapitre « Continuité d'une fonction, application aux suites ».

→ À CONNAÎTRE ←

- si u est dérivable et strictement positive : $(\sqrt{u})' =$
- si u est dérivable, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $(u^n)' =$
- si u est dérivable : $(e^u)' =$

EXEMPLE A1



f est la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x^2 + x}$.

- a. Justifier que f est dérivable sur $]0; +\infty[$.
- b. Calculer la dérivée de f sur $]0; +\infty[$.
- c. Étudier le signe de f' sur $]0; +\infty[$ et en déduire les variations de f sur $[0; +\infty[$.

EXEMPLES C1 ET C2

1. Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x^3 - 5x^2 + 6x}$.

Justifier que f est dérivable sur $]0; +\infty[$ et déterminer f' .

2. Soit g la fonction définie sur \mathbb{R} par $g(x) = (-8x^5 + 7x^4 - 6x^3 + 5x - 4)^5$.


Justifier que g est dérivable sur \mathbb{R} et déterminer g' .

II. Convexité/concavité et point d'inflexion d'une fonction

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .


DÉFINITION

- On dit que f est **convexe** sur I si sa courbe représentative est entièrement située en dessous de chacune de ses cordes.
- On dit que f est **concave** sur I si sa courbe représentative est entièrement située au-dessus de chacune de ses cordes (autre définition : si $-f$ est convexe).



← convexe

→ concave



source des images :
éd. Hachette, coll. Barbazo, 2020

THÉORÈMES (ADMIS)

- Si f est dérivable sur I :
- f est **convexe** si et seulement si f' est **croissante** sur I
 - f est **concave** si et seulement si f' est **décroissante** sur I


COROLLAIRES

- Si f est deux fois dérivable sur I :
- f est **convexe** si et seulement si f'' est **positive** sur I
 - f est **concave** si et seulement si f'' est **négative** sur I
- se lit « f seconde »


THÉORÈMES (ADMIS)

- Si f est dérivable sur I :
- f est **convexe** si et seulement si C_f est entièrement située **au-dessus** de chacune de ses **tangentes**.
 - f est **concave** si et seulement si C_f est entièrement située **en dessous** de chacune de ses **tangentes**.

EXEMPLES :



La fonction carré $x \mapsto x^2$ est convexe.



La fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$ est concave sur $] -\infty; 0[$ et convexe sur $] 0; +\infty[$

Source des images : <http://yallouz.arie.free.fr>

Démonstration de la propriété « si f'' est positive, alors f est au-dessus de ses tangentes » :

DÉMO. EX.
tsm-cdc-demo1
< 9 min


ou



EXEMPLE C3

La fonction exp est convexe sur \mathbb{R} .

EXEMPLE A2




f est la fonction définie sur $] -2; +\infty[$ par $f(x) = \frac{3}{x+2}$. Étudier la convexité de f sur $] -2; +\infty[$.

DÉFINITION

On note C_f la courbe représentative de f . S'il existe un point A de C_f tel que cette dernière « traverse » sa tangente en A , on dit que A est un **point d'inflexion** de C_f .

Plus précisément, un point d'inflexion est un point où s'opère un changement de convexité.

EXEMPLE :



Source : <http://yallouz.arie.free.fr>

EXEMPLE C4

La courbe ci-dessus est celle de la fonction polynomiale f définie par $f(x) = x^5 - 5x^4 - 40x + 120$.
Démontrer que sa courbe admet un unique point d'inflexion.

PROPRIÉTÉ

Si f est convexe sur I , alors : $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}$.

Démonstration : supposons que f est convexe sur I .

Soient $A(a; f(a))$ et $B(b; f(b))$ deux points de C_f . Si $a=b$, les inégalités sont triviales.

Si $a \neq b$: f est convexe donc C_f est en dessous de la corde $[AB]$, c'est donc en particulier vrai au point milieu de la corde $[AB]$ (on le note M), c'est-à-dire au point d'abscisse $\frac{a+b}{2}$.

Or (AB) a pour équation réduite $y = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + f(a)$ donc l'ordonnée de M est :

$$y = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \left(\frac{a+b}{2} - a \right) + f(a) = \dots = \frac{f(a)+f(b)}{2}, \text{ d'où le résultat.}$$

REMARQUE 1 (HORS PROGRAMME¹) : si f est continue sur I , la réciproque est vraie ! Si f n'est pas continue, la réciproque n'est pas nécessairement vraie (contre-exemple compliqué, pathologique²...).

REMARQUE 2 : une fonction convexe n'est pas nécessairement dérivable.

Par exemple, la fonction $x \mapsto |x|$ est convexe sur \mathbb{R} mais n'est pas dérivable en 0.

REMARQUE 3 (HORS PROGRAMME³) : on peut même démontrer que si f est convexe sur I , alors pour tous



réels x_1, x_2, \dots, x_n de I et pour tous réels $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ tels que $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$,

$$f\left(\sum_{k=1}^n \lambda_k x_k\right) \leq \sum_{k=1}^n \lambda_k f(x_k).$$

C'est l'**inégalité de Jensen**, due au mathématicien danois Johan Jensen (1859–1925) qui en donna la preuve en 1906.

EXEMPLE C5

La fonction \exp étant convexe sur \mathbb{R} , on peut donc écrire que : $\forall (x; y) \in \mathbb{R}^2, e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}$.

→ BILAN DU CHAPITRE & TRAVAIL EN AUTONOMIE ←



- Fiche bilan → p.236
- QCM 12 questions corrigées → p.237
- Exercices corrigés → 32 à 39 p.238
- Exercice type Bac guidé & corrigé → 105 p.250

• Un exercice type corrigé (économie : coût marginal) → tsm-cdc-met

• Méthodes et exercices corrigés en vidéo : → maths-et-tiques : tsm-cdc-ym1 et tsm-cdc-ym2

1 Voir l'approfondissement « Convexité, continuité et milieux » : mathemathieu.fr/1493.

2 Voir page 3 de math.univ-lyon1.fr/capes/IMG/pdf/new_caracterisation.pdf et/ou fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_fonctionnelle_de_Cauchy.

3 Voir l'approfondissement « Inégalité de Jensen » : mathemathieu.fr/1492.